



# HER 30 SANİYEDE, 1 DİYABET HASTASI AYAĞINI KAYBEDİYOR.<sup>1</sup>



## Nedenini biliyor musunuz ?


### Diyabetik Periferik Nöropati Nedir?

- Dünya çapında diyabet ve prediyabet yükündeki artışın, önümüzdeki yıllarda diyabetik nöropati gibi kronik diyabetle ilişkili komplikasyonların artan yaygınlığı şeklinde de kendini göstermesi bekleniyor .
- Diyabetik nöropati, hem tip 1 diyabetin (T1D) hem de tip 2 diyabetin (T2D) en yaygın ve sorunlu komplikasyonlarından biriyken, prediyabetli hastalarda da diyabetik nöropati gelişebilir.
- En yaygın diyabetik nöropati, distal simetrik polinöropatidir (tipik diyabetik nöropati olarak da bilinir) ve diyabetik periferik nöropati (DPN) olarak adlandırılır.
- Diyabetik Periferik Nöropati, nöropatik ağrıyla birlikte veya olmadan, distal duysal veya motor fonksiyon kaybının karakteristik eldiven ve çorap benzeri sunumu da dahil olmak üzere periferik sinirlere verilen hasarı ifade eder.




### DPN kaç hastayı etkiler?

- Tedavi edilmeyen DPN'nin hasta morbiditesi ve yaşam kalitesi üzerinde önemli etkileri vardır.( Uzun duyusunun kaybı, düşmeler ve ayak ülseri ve alt uzuv amputasyonlarının artmış riski).
- DPN'li diyabetik hastalar ayrıca DPN'siz olanlara göre tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler mortalite açısından daha yüksek risk altındadır.



DPN, Tip 1 DM ve  
Tip 2 DM hastalarının

**%50** 'sine kadarını



ve prediyabetik  
hastaların en az

**%10** kadarını etkiler