

**BİLEŞİMİ:**

Her 100 g çözelti etkin madde olarak 80 g Pelargonium sidoides kökü sıvı ekstresi (EPs® 7630), çözücü ve koruyucu olarak etanol ve gliserol içermektedir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ:

Umca Solüsyon; sardunya köklerinden çıkarılan bir öz içermektedir. Vatanı Güney Afrika olan bu bitki, orada uzun bir süredir geleneksel tıp uygulamalarının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Umca özü bronşit, sinüzit, anjin (boğaz ağrısı), viral enfeksiyonlara bağlı burun akıntısı ve farenjit olgularında etkili olduğu saptanmıştır.

Umca özü, bağışıklık sistemini güçlendirici antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca bazı bakterilere karşı antibakteriyel etkisinin yanı sıra antioksidatif özelliklerine sahiptir. Bunun dışında, organizmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve solunum epitel hücrelerinin silia vuru sıklığını artırarak balgam söktürücü etkiye sahip olduğu da bildirilmiştir.

Bu nedenle Umca, değişik akut ve kronik enfeksiyonların özellikle de üst solunum yolları enfeksiyonları ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonlarının tedavisi için uygundur.

Umca uygulaması ile öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik-yorgunluk gibi yakınmalarda hızlı bir iyileşme sağlanabilmektedir.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

Umca, akut ve kronik enfeksiyonlar, özellikle de solunum yolları enfeksiyonları ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonları (örneğin bronşit, sinüzit, anjin, rinofarenjit gibi) tedavisi için uygundur.

Umca uygulaması öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik-yorgunluk gibi yakınmalarda tedaviye yardımcıdır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:

Umca'nın içindeki bulunan maddelerine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır. Kanama eğiliminin yüksek olduğu hastalarda veya kan pıhtılaşması önleyen ilaçlar alanlarda kullanılmamalıdır. Yeterli klinik deneyim olmadığı için, ağır karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Umca 1 yaşın altındaki bebeklerde önerilmemektedir.

Gebeler veya emziren anneler tarafından kullanımı önerilmemektedir.

Etanol içermesi nedeniyle araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

"Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz."

"Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz."

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

Enfeksiyon durumlarında örneğin akut bronşitte karın ağrısı, mide yanması bulantı ve ishal gibi yakınmalar görülebilir. Nadiren, bu yakınmalar Umca kullanımına bağlı olabilir.



MOIER typo & Litho
Rheinstraße 44 • 76185 Karlsruhe Fon 0721/952610 • Fax 9526199 mailto:info@moier.de • www.moier.de
Schwabe/Export
Umca Loes TR GI
263 846 40-5
Ident Nr. neu
00523-0520
Dummy-Nr.
148x250mm 2-seitig
Format
Schwarz
Farben
PDM 105/5/AW 1828
PDM-Akte
Illustrator CC
Programm
Pfaden
Schriften
20.07.2020
Änderung
Korrektur
Digitale Freigabe
Datenpool

Nadir vakalarda, hafif diş eti veya burun kanaması görülebilir. Umca'nın içindeki bulunan maddelerine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda çok nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonlar gelişebilir. Bu tür reaksiyonlarda yüzde ödem (şişlik), nefes darlığı ve kan basıncında düşüş görülebilir ve ürünün ilk alımından sonra gelişebilir. Böyle bir durumda derhal doktora başvurulmalıdır.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

Kumarin türevleri ile birlikte kullanılması durumunda, kan pıhtılaşmasını engelleyici etkide bir artış meydana gelebilir. Bu nedenle koagülasyonu inhibe eden ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda günde 3 defa 30 damla, 6-12 yaş arası çocuklarda günde 3 defa 20 damla, ve 1-5 yaş arası çocuklarda günde 3 defa 10 damla şeklinde kullanılır. Damlalar, yemeklerden 30 dakika önce bir miktar sıvı ile birlikte içilmelidir. Hastalığın nüksetmemesi için, hastalığın belirtileri hafiflemesini takiben ilacın kullanımına birkaç gün daha devam edilmesi önerilir. Umca şişesi açıldıktan sonra oda ısısında muhafaza edildiği takdirde 6 ay boyunca kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

20 ve 50 ml'lik kendinden damlalıklı cam şişelerde

İZİN SAHİBİ VE ADRESİ:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4
34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

ÜRETİCİ İSİM VE ADRESİ:

ISO Arzneimittel GmbH & Co. KG lisansıya
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Karlsruhe / ALMANYA

İZİN TARİHİ VE NUMARASI:

11.03.2008 - 2008/10

"25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği ve erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız."

Bu ürünün tıbbi yararı geleneksel kullanıma ve literatüre dayanmaktadır, Tıbbi Müstahzar (ilaç) olarak değerlendirilmemiştir.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.



263 846 40-5 - C. 1121 - 105/5/1828

MOIER
typo & litho

Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe
Fon 0721/952610 · Fax 9526199
info@moier.de · www.moier.de

Schwabe/Export

Umca Loes TR GI

263 846 40-5
Ident Nr. neu
00523-0520
Dummy-Nr.
148x250mm 2-seitig

Format
Schwarz
Farben
PDM 105/5/AW 1828
PDM-Akte
Illustrator CC

Programm
Pfade
Schriften
20.07.2020
Änderung

Korrektur

Digitale Freigabe

Datenpool