



KULLANIM KILAVUZU

UMCA ŞURUP

BİRİM FORMÜLÜ:

100 gram (= 93,985 mL) şurup, Pelargonium sidoides köklerinden çıkartılan 0,2506 gram kurutulmuş sıvı ekstresini (EPs® 7630) içermektedir. Yardımcı madde olarak malto-dekstrin, ksilitol, gliserol, sitrik asit anhidr, potasyum sorbat, ksantan sakızı ve saf su içerir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ:

UMCA Şurup; *Pelargonium sidoides*'in kökünden elde edilen bir öz içermektedir. Vatanı Güney Afrika olan bu bitki, orada uzun bir süredir geleneksel tıp uygulamalarının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Umca özünün bronşit, sinüzit, anjin (boğaz ağrısı), viral enfeksiyonlara bağlı burun akıntısı ve farenjit olgularında etkili olduğu saptanmıştır. UMCA özü, bağışıklık sistemini güçlendirici antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca bazı bakterilere karşı antibakteriyel etkisinin yanısıra antioksidatif özelliklere sahiptir. Bunun dışında, organizmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve solunum yolu mukozasındaki titre tüylerin vurum sıklığını artırarak balgam söktürücü etkiye sahip olduğu da bildirilmiştir.

Bu nedenle UMCA, değişik akut ve kronik enfeksiyonların özellikle de üst solunum yolları enfeksiyonları ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonları için tedaviye yardımcı olarak kullanımı uygundur.

UMCA uygulaması ile öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik-yorgunluk gibi yakınmalarda tedaviye yardımcıdır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

UMCA, akut ve kronik enfeksiyonlar, özellikle de solunum yolları enfeksiyonları

(örneğin soğuk algınlığı ve bronşit gibi) ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonları (örneğin sinüzit, anjin, rinofarenjit gibi) tedavisine yardımcıdır.

UMCA öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik-yorgunluk gibi yakınmaların tedavisine yardımcıdır.

KULLANILMAMASI GEREKEN

DURUMLAR:

UMCA'nın içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde kullanılmamalıdır. Kanama eğiliminin yüksek olduğu hastalarda veya kan pıhtılaşması önleyen ilaçlar alanlarda kullanılmamalıdır. Yeterli klinik deneyim olmadığı için, ağır karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Umca 1 yaşın altındaki bebeklerde önerilmemektedir.

Gebeler veya emziren anneler tarafından kullanımı önerilmemektedir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 200 mg potasyum sorbat ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

"Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz."

"Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz."

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

Enfeksiyon durumlarında örneğin akut bronşitte karın ağrısı, mide yanması bulantı ve ishal gibi yakınmalar görülebilir. Nadiren, bu yakınmalar UMCA kullanımına bağlı olabilir.

Nadir vakalarda, hafif diş eti veya burun kanaması görülebilir.

MAIER
Typo & Litho

Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe
Fon 0721/95 2610 · Fax 95 26199
info@maier-tl.de · www.maier-tl.de

Schwabe/Export

Umca Sirup 100 ml
TR GI

263 846 43-4
Ident-Nr. neu

00515-0520
Dummy-Nr. alt

148x250 mm 2-seitig
Format

schwarz
Farben

Pragmatica
Schriftart

8,6 pt
Schriftgröße

PDM 14/9/AW 1827
PDM-Akte

17.07.2020
Auf Dummy aufgebaut

Korrektur

Digitale Freigabe

Datenpool

MAIER
Typo & Litho

Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe
Fon 0721/952610 · Fax 9526199
info@maier-ll.de · www.maier-ll.de

Schwabe/Export

Umca Sirup 100 ml

TR GI

263 846 43-4

Ident-Nr. neu

00515-0520

Dummy-Nr. alt

148x250 mm 2-seitig

Format

schwarz

Farben

Pragmatica

Schriftart

8,6 pt

Schriftgröße

PDM 14/9/AW 1827

PDM-Akte

17.07.2020

Auf Dummy aufgebaut

Korrektur

Digitale Freigabe

Datenpool

UMCA'nın içinde bulunan maddelere karşı aşırı hassasiyeti olanlarda çok nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonlar gelişebilir. Bu tür reaksiyonlarda yüzde ödem (şişlik), nefes darlığı ve kan basıncında düşüş görülebilir ve ürünün ilk alımından sonra gelişebilir. Böyle bir durumda derhal doktora başvurulmalıdır.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçları alanlarda kullanılmamalıdır.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

- Yetişkinler ve 12 yaş üstü ergenlerde, günde üç defa (sabah, öğle, akşam) 7.5 ml şurup,
- 6 ilâ 12 yaşlarındaki çocuklarda, günde üç defa (sabah, öğle, akşam) 5 ml şurup,
- 1 ilâ 5 yaşlarındaki çocuklar, günde üç defa (sabah, öğle, akşam) 2.5 ml şurup şeklinde kullanılır.

Hastalığın nüksetmemesi için, hastalığın belirtileri hafiflemesini takiben UMCA kullanımına birkaç gün daha devam edilmesi önerilir. Tedavi süresi 3 haftayı geçmemelidir.

UMCA'nın 1 yaş altı çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir (Çünkü, bu popülasyon için elde edilen güvenilirlik ve etkinlik verileri yeterli düzeyde değildir.)

UMCA Şurup şişesi açıldıktan sonra, oda ısısında muhafaza edildiği takdirde 6 ay boyunca kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ve 200 ml'lik cam şişelerde mevcuttur.

İZİN SAHİBİ:

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

263 846 43-4 · C. 224 · 14/9/1827

ÜRETİM YERİ & LİSANS SAHİBİ:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Karlsruhe /ALMANYA

İZİN NUMARASI:

10.06.2011 - 2011/19

“25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.”

“Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.”

BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA VE LİTERATÜRE DAYANMAKTADIR. TIBBİ MÜSTAHAZAR (İLAÇ) OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.

